

PERFIL CLÍNICO Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO EN GESTANTES TRATADAS COMO DIABETES GESTACIONAL SIN SOG 100G

P-050

AUTORES: Villahoz MA, Camarero M, Zarandona A, Pérez U, Aguirre U, Urbano C, Fraile A

La sobrecarga oral de glucosa de 100 gramos (SOG 100 g) es el estándar diagnóstico para la diabetes gestacional (DG). Sin embargo, algunas mujeres son tratadas como DG sin realizarla. El perfil de riesgo y necesidad de tratamiento de este grupo personas no ha sido suficientemente estudiado.

OBJETIVOS

Analizar:

- Características clínicas
- Factores de riesgo
- Pacientes con tratamiento insulínico
- Factores asociados al tratamiento

METODOLOGÍA

Estudio observacional retrospectivo



Muestra

47 mujeres embarazadas tratadas como DG sin SOG 100g entre junio de 2024 y octubre de 2025 en el Hospital Universitario Galdakao-Usansolo (Bizkaia)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

GC elevadas según grupo de tratamiento

Sin tto. farmacológico


$p < 0.0001$

Con tto. farmacológico




Inicio del tratamiento y momento del diagnóstico

Distribución del tto. según semana de diagnóstico



Proporción acumulada por franja temporal




La indicación de tratamiento farmacológico depende del mal control glucémico

El inicio del tratamiento se relaciona con el momento del diagnóstico.

Factores de riesgo clásicos: distribución por grupo de tratamiento


IMC categorizado

$p = 0.711$




DG previa

$p = 0.724$




Antecedentes familiares DM

$p = 0.500$




Semana de embarazo

$p = 0.411$




País de procedencia

$p = 0.839$



Hijo > 4 kg previo

$p = 0.820$



El resto de los factores de riesgo no influyen en la indicación de tratamiento