

EVOLUCION DEL GRADO DE CONTROL LIPIDICO POST INFARTO EN EL PERIODO 2016-2024. COMPARACION ENTRE PERSONAS CON O SIN DIABETES.


Jiménez Sellés, Pedro; Pomares Gómez F.; Cordero Fort A; Chicharro Luna E; Cascales Guerrero, G; Flores Pardo E; Salinas Serrano JM.

Hospital Universitario San Juan de Alicante. Servicio de Endocrinología, Cardiología, Documentación Clínica y Admisión, Informática y Centros de Salud de Mutxamel (Alicante) y Orihuela (Alicante). Clínica Universitaria de Podología. Universidad Miguel Hernández. San Juan de Alicante (Alicante).


Introducción y objetivos: Analizar el grado de control de LDL colesterol en los 12 meses posteriores (12MPOST) al ingreso por cardiopatía isquémica aguda y su relación con la mortalidad por grupos de edad y sexo.

Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo. Pacientes ingresados por cardiopatía isquémica aguda en el periodo 2016-2024 (P16-24) en todo un departamento de salud (247.320 hab). Se analizó solo el primer ingreso en los pacientes con varios ingresos. Revisión del perfil lipídico en los 12MPOST. Se consideró buen control (BC) un LDL-colesterol < 55mg/dl. Análisis de mortalidad en el 2016-2024.


PACIENTES CON ANALITICA DE PERFIL LIPIDICO EN LOS 12 MESES SIGUIENTES AL ALTA POR CARDIOPATIA ISQUEMICA SEGUN PRESENCIA DE DIABETES




PACIENTES CON ANALITICA DE PERFIL LIPIDICO EN LOS 12 MESES SIGUIENTES AL ALTA POR CARDIOPATIA ISQUEMICA SEGUN PRESENCIA DE DIABETES Y SEXO



PACIENTES CON LDL-C <70 mg/dl EN LOS 12 MESES SIGUIENTES AL ALTA POR CARDIOPATIA ISQUEMICA SEGUN PRESENCIA DE DIABETES Y SEXO




PACIENTES CON LDL-C <55 mg/dl EN LOS 12 MESES SIGUIENTES AL ALTA POR CARDIOPATIA ISQUEMICA SEGUN PRESENCIA DE DIABETES Y SEXO




	NO DIABETES					DIABETES			
	Sexo	Media	Desv. Típica	p	Sexo	Media	Desv. Típica	p	
Colesterol total	Hombre	140,3	37,6	0,00	Hombre	131,1	37,8	0,00	
	Mujer	159,1	41,8		Mujer	148,3	45,3		
HDL Colesterol	Hombre	43,1	11,9	0,00	Hombre	39,4	11,2	0,00	
	Mujer	49,7	15,3		Mujer	44,7	13,6		
Triglicéridos	Hombre	111,3	67,2	0,42	Hombre	129,3	79,6	0,09	
	Mujer	113,6	52,6		Mujer	137,3	74,5		
LDL-Colesterol	Hombre	75,0	31,5	0,00	Hombre	65,6	29,7	0,00	
	Mujer	86,0	35,4		Mujer	76,1	36,4		
Colesterol NO HDL	Hombre	97,1	35,5	0,00	Hombre	91,5	34,5	0,00	
	Mujer	108,9	38,6		Mujer	103,5	41,7		


PACIENTES CON LDL-C <55 mg/dl EN LOS 12 MESES SIGUIENTES AL ALTA POR CARDIOPATIA ISQUEMICA SEGUN AÑO, SEXO Y PRESENCIA DE DIABETES



PACIENTES CON ANALITICA DE PERFIL LIPIDICO EN LOS 12 MESES SIGUIENTES AL ALTA POR CARDIOPATIA ISQUEMICA SEGUN AÑO, SEXO Y PRESENCIA DE DIABETES



PACIENTES CON LDL-C <70 mg/dl EN LOS 12 MESES SIGUIENTES AL ALTA POR CARDIOPATIA ISQUEMICA SEGUN AÑO, SEXO Y PRESENCIA DE DIABETES



Conclusiones:

- Casi uno de cada tres pacientes carece de perfil lipídico en el año posterior al alta hospitalaria por CISQ aunque la proporción fue menor en las personas con DM.
- El control lipídico es mejor en hombres que en mujeres y mejor en personas con DM que sin DM. Solo uno de cada 3 tiene un LDLc < 55 mg/dl en el año posterior al ingreso, siendo mayor en las personas con DM.
- Un nivel de LDLc<55 mg/l se asocia a una menor mortalidad en el año postinfarto.